

Хищные животные Сибири.



Бурый медведь.

Характерный обитатель лесов таежного типа. Он заселяет почти всю лесную полосу европейской части России, Сибири, Дальнего Востока. По образу жизни бурый медведь — сумеречное животное. Днем скрывается в глухих местах тайги и только вечером выходит на поиски корма. Лес доставляет ему обильную и разнообразную пищу. В начале лета он поедает молодые побеги, корни, луковицы, позже — грибы, ягоды, желуди, орехи.



Сибирский лесной волк.

Обычно волк-самец весит около 50 килограммов, волчица - килограммов на 5 меньше. Их высота- около 75 сантиметров, а длина от носа да кончика хвоста достигает 1,5 - 2 метров.

Волки - общественные животные: они живут семьями. В любой стае каждому отведено свое место. Сильные и агрессивные волки верховодят, а те, кому нужна твердая рука, подчиняются им.

Обычно в волчьей семье бывает 6 - 7, а иногда и 15 животных. Самый сильный волк в стае становится вожаком. Править ему помогает подруга - волчица. В стае, где за порядком следит вожак, волки между собой обычно не дерутся. Однако с чужаками или нарушившими границу владений волками-одиночками стычки случаются часто. Каждая волчья стая охотится только на своей территории. Хозяева строго охраняют и метят ее, предупреждая соседей, что им следует держаться подальше. Любой непрошенный гость будет наказан.



Красная или Обыкновенная лисица.

Лисица в зимнем меху – красивый, нарядно одетый, пропорционально сложенный зверь. Пышный яркий мех, хорошо опушенный и оттого толстый длинный хвост («труба» у охотников), стройное тело не могут не вызывать восхищения у наблюдателя.

Охотника, впрочем, мало волнует красота зверя – ему главное добыть его...

Длина туловища взрослых особей, без хвоста, 50-90 см, хвост (без концевых волос) – 35-60 см, высота в плечах – 35-50 см. Масса от 3,0 до 10,0 кг.

Зимний мех длинный, густой, шелковистый. Общий тон окраски – красноватый, с рыжим оттенком, по хребту идет более темная полоса. Нижняя часть тела, от подбородка до груди, – белая, брюхо темное, передняя сторона лап темно-бурая.



Сибирская рысь.

Рысь - самый крупный и самый северный представитель мелких кошек, обитающий на территории России, достигающий массы тела до 37 кг. Разные подвиды рыси обитают в Евразии и Северной Америке. Сибирская рысь распространена в Западной Сибири, Алтае, Хакасии; обитает в горной тайге Алтая и смешанных лесах. Основу ее питания составляют зайцы, косули, кабарги, различные птицы, грызуны, а также молодняк оленей, кабанов и лосей. Питается мелкими копытными, грызунами, птицами. Беременность 66-78 дней (2 месяца). Рождаются 2-4 детеныша. Убежищем семейству рысей служит логово под вывороченными корнями упавшего дерева, либо яма; земляная пещера, старая барсучья нора, расположенная в укромном месте.



Песец.

Небольшой хищник, похожий на лисицу.

Длина туловища животного 50 – 75 см, размер хвоста – 25 – 30 см, высота около – 20 – 30 см, вес тела – 6 – 10 кг. Песец

пониже лисицы и у него покороче мордочка. Закругленные ушки едва заметны на пушистой шерсти, что оберегает их от обморожения. На

подошвах лап имеется жесткий волос.

Жилище песца представляет собой запутанный лабиринт с 60 – 80 входами.

Жилище песца является сложной постройкой, но глубина норы не превышает одного метра, так как у животного возникают сложности из-за промерзшей земли. Норы расположены на расстоянии полутора километров от водоема. Питается песец различными кормами, как животными, так и растительными. Но преобладают в пище животного мелкие грызуны (лемминги) и птицы. Поедает песец рыбу, из растительной пищи употребляет ягоды (чернику, морошку), водоросли (морскую капусту) и травы.



Соболь.

Длина тела соболя — до 56 см, хвоста — до 20 см. Окраска шкурки : «Головка» — самая темная (почти черная), «Меховой» — окраска очень светлая, песчано-желтая или палевая. Следы — парные крупные отпечатки размером от 5х7 до 6х10 см.


Длина прыжка — 30—70 см. Характерный обитатель сибирской тайги. Ловкий и очень сильный для своих размеров хищник. Ведет наземный образ жизни.

Передвигается прыжками. В питании преобладают мышевидные грызуны, главным образом красная полевка (на юге красно-серая). Восточнее Енисея и в Саянах большую роль в питании играет пищуха. Часто поедает белок, нападает на зайцев. Из птиц соболь чаще всего нападает на рябчика и глухаря. Индивидуальный охотничий участок соболя от 150—200 га до 1500—2000 га, иногда и больше.

Охотно питается растительной пищей. Любимая пища — кедровые орехи, рябина, голубика. Охотно поедает ягоды брусники, черники, черёмухи, шиповника, смородины.



Отсутствие хищников влияет на состояние пищевых цепей на суше, в море и в воздухе. Часто исчезновение хищника затрагивает существование как средних хищников и травоядных животных, так и растений и даже мелких водорослей.



Отсутствие травоядных повлияет на растительный мир и состояние хищников в пищевой цепи.



Исчезновение растительного мира затрагивает существование как травоядных животных, так и хищников.



*Сохраним экологическое равновесие в природе –
залог нашей жизни на планете.*

